

การศึกษาและพัฒนาแบบประเมินอาการผู้ป่วยติดสารระเหย
The Development Withdrawals and Symptoms Form of Inhalant Patients.

บทคัดย่อ

บทนำ

การพัฒนาแบบประเมินอาการทางคลินิกผู้เสพติดสารระเหยเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประเมินอาการผู้ป่วยเสพติดสารระเหยได้เที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือ เหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยมากขึ้น

วัตถุประสงค์

ศึกษาและพัฒนาแบบประเมินอาการทางคลินิกผู้ติดสารระเหย(แบบประเมินภาวะถอนพิษผู้ป่วยสารระเหย) สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี และทดสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบประเมิน

วิธีการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบ A cross-sectional study กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยในระยะถอนยาผู้ป่วยสารระเหย จำนวน 30 คนสถานที่เก็บข้อมูลวิจัย คือหอผู้ป่วยที่รับผู้ป่วยเสพติดสารระเหยไว้ในความดูแล คณะผู้วิจัยภาคสนามพยาบาลมีประสบการณ์การพยาบาลด้านยาเสพติดมากกว่า 3 ปี จำนวน 6 คนและผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือ การประเมินอาการขาดสารระเหย การวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และเปรียบเทียบหาความไว ความจำเพาะ ค่าทำนายโอกาสที่ผู้ป่วยเกิดอาการหรือไม่เกิดอาการและ Likelihood Ratio Ratioของเครื่องมือแบบสอบถาม

ผลการศึกษา

พบว่าแบบประเมินอาการขาดสารระเหย (Assessment Inhalant Withdrawals Symptoms Scale) มีค่า Cronbach's Alpha รายข้ออยู่ระหว่าง 0.267-0.710 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.794มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ0.741 (P-value<0.001) ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงพบว่า มีค่าความไว ค่าความจำเพาะ และค่า Likelihood Ratio เท่ากับ ร้อยละ 98.89 และ 8.80 (1.39-55.90) ระดับอาการปานกลาง Moderate เท่ากับ 18, 98 และ 8.49 (1.14-63.05) ส่วนระดับอาการรุนแรง Severe เท่ากับ ร้อยละ 89, 98 และ 40.89 (5.80-288.05)

สรุป

แบบประเมินอาการแบบประเมินอาการขาดสารระเหย (Assessment Inhalant Withdrawals Symptoms Scale) มีความเที่ยงในระดับดี และมีความจำเพาะค่อนข้างสูง จึงสามารถนำมาประเมินและติดตามอาการขาดสารระเหยได้